



Einnahmezeitpunkte- Orale Krebsmedikation

„Altsubstanzen“, klassische Zytostatika, Nicht- Kinaseinhibitoren

Einnahme mit der Nahrung	Einnahme ohne Nahrung	Egal
Capecitabin ¹	Chlorambucil	Anagrelid
Mitotane ²	Etoposid ⁴	Azacitidin
Tretinoin	Decitabin / Cedazurin	Bexaroten
Trifluridin : Tipiracil (1 : 0,5) ³	Lomustin ⁸	Busulfan
Vinorelbin	Melphalan ⁹	Cyclophosphamid ⁵
	Methotrexat	Fludarabin
	Tegafur : Gimeracil : Oteracil (S1)	Hydroxycarbamid
	Tegafur : Uracil (1:4)	Idarubicin
	Temozolomid ⁴	Lenalidomid
	Tioguanin ⁴	Mercaptopurin ⁶
		Pomalidomid
		Procarbazin
		Thalidomid
		Topotecan
		Treosulfan ⁷
		Trofosfamid ⁵
¹ Mit der Mahlzeit besser verträglich, deshalb innerhalb 30 Min nach einer Mahlzeit		
² Am besten mit fettreicher Mahlzeit		
³ innerhalb 1 Stunde nach einer Mahlzeit		
⁴ auf nüchternen Magen		
⁵ dazu ausreichend trinken, keine genauen Angaben zur Mahlzeit in FI		
⁶ immer entweder mit oder ohne Mahlzeit, mindestens 1 Stunde vor oder 2 Stunden nach Milchprodukten		
⁷ mit Milch oder Nahrung besser verträglich		
⁸ mindestens 3 Stunden nach einer Mahlzeit oder abends vor dem Schlafengehen		
⁹ mindestens 30 Minuten vor einer Mahlzeit		
FDA-Zulassung / keine orale Darreichungsform in D		

Autor: Jürgen Barth, Apotheker für Klinische Pharmazie & Onkologische Pharmazie,
Universitätsklinikum Gießen-Marburg; Aktualisierung: Oralia-DB Redaktion;

Quelle: Deutsche Fachinformationen (FI) bzw. bei nicht in D zugelassenen die FPI ; Stand: 06/2024;

Trotz sorgfältiger Prüfung wird keine Gewährleistung für Richtigkeit, Aktualität und Vollständigkeit der Angaben und keinerlei Haftung für eventuelle Fehler übernommen.



Kinase- Inhibitoren

Einnahme mit der Nahrung	Einnahme ohne Nahrung	Egal
Alectinib	Afatinib	Abemaciclib
Alpelisib ¹	Asciminib	Acalabrutinib
Bosutinib	Avapritinib (BV+)	Axitinib
Ceritinib ⁵	Cabozantinib (BV+)	Binimetinib
Imatinib	Dabrafenib	Brigatinib
Midostaurin	Erlotinib (BV+)	Capivasertib
Neratinib	Lapatinib (BV+)	Capmatinib
Nintedanib	Nilotinib (BV+)	Cobimetinib
Regorafenib ²	Pazopanib (BV+)	Crizotinib
Tepotinib	Pexidartinib (BV+)	Dacomitinib
	Pralsetinib (BV+)	Dasatinib
	Trametinib	Duvelisib
		Encorafenib
		Entrectinib
		Erdaftinib
		Everolimus ³
		Fedratinib
		Fruquintinib
		Futibatinib
		Gefitinib
		Gilteritinib
		Ibrutinib ⁴
		Idelalisib
		Larotrectinib
		Lenvatinib
		Lorlatinib
		Momelotinib
		Osimertinib
		Palbociclib
		Pemigatinib
		Pirtobrutinib
		Ponatinib
		Quizartinib
		Reprotrectinib
		Ribociclib
		Ripretinib
		Ruxolitinib

Autor: Jürgen Barth, Apotheker für Klinische Pharmazie & Onkologische Pharmazie,
Universitätsklinikum Gießen-Marburg; Aktualisierung: Oralia-DB Redaktion;

Quelle: Deutsche Fachinformationen (FI) bzw. bei nicht in D zugelassenen die FPI ; Stand: 06/2024;

Trotz sorgfältiger Prüfung wird keine Gewährleistung für Richtigkeit, Aktualität und Vollständigkeit der Angaben und keinerlei Haftung für eventuelle Fehler übernommen.



Einnahme mit der Nahrung	Einnahme ohne Nahrung	Egal
		Selpercatinib
		Selumetinib
		Sorafenib ⁶
		Sunitinib
		Tivozanib
		Tucatinib
		Vandetanib
		Vemurafenib
		Zanbrutinib
¹ unmittelbar nach Mahlzeit		
² nach leichter Mahlzeit		
³ immer entweder mit oder immer ohne Mahlzeit		
⁴ keine genauen Angaben zur Mahlzeit in FI (BV+)		
⁵ Die Mahlzeit kann von einer leicht bis hin zu einer vollwertigen Mahlzeit variieren.		
⁶ unabhängig von Mahlzeit oder zusammen mit einer leicht oder mäßig fettreichen Mahlzeit, bei fettreicher Mahlzeit mindestens 1 Stunde vor oder 2 Stunden nach der Mahlzeit		
(BV+): muss nüchtern eingenommen werden, da mit der Nahrung die Bioverfügbarkeit steigt		
FDA-Zulassung / keine orale Darreichungsform in D		
In Deutschland zugelassen, jedoch nicht am Markt verfügbar. Muss per Kostenübernahmeantrag importiert werden.		

Sonstige Enzyminhibitoren

Einnahme mit der Nahrung	Einnahme ohne Nahrung	Egal
Venetoclax	Ixazomib	Adagrasib
	Niraparib ¹	Eflornithin
	Olutasidenib	Enasidenib
	Sonidegib (BV+)	Glasdegib
		Ivosidenib
		Nirogacestat
		Olaparib
		Panobinostat
		Rucaparib
		Selinexor
		Sotorasib
		Talazoparib
		Tazemetostat
		Vismodegib
¹ Laut Fachinformation auch Einnahme mit einer leichten Mahlzeit möglich		
(BV+): muss nüchtern eingenommen werden, da mit der Nahrung die Bioverfügbarkeit steigt		
FDA-Zulassung / keine orale Darreichungsform in D		

Autor: Jürgen Barth, Apotheker für Klinische Pharmazie & Onkologische Pharmazie,
Universitätsklinikum Gießen-Marburg; Aktualisierung: Oralia-DB Redaktion;

Quelle: Deutsche Fachinformationen (FI) bzw. bei nicht in D Zulassenen die FPI ; Stand: 06/2024;

Trotz sorgfältiger Prüfung wird keine Gewährleistung für Richtigkeit, Aktualität und Vollständigkeit der Angaben und keinerlei Haftung für eventuelle Fehler übernommen.



Hormonpräparate

Einnahme mit der Nahrung	Einnahme ohne Nahrung	Egal
Darolutamid	Abirateron (BV+)	Anastrozol
Elacestrant*		Apalutamid
		Bicalutamid
		Enzalutamid
		Exemestan
		Letrozol
		Relugolix

(BV+): muss nüchtern eingenommen werden, da mit der Nahrung die Bioverfügbarkeit steigt
* zusammen mit einer leichten Mahlzeit einzunehmen. Die Einnahme zusammen mit Nahrung kann auch Übelkeit und Erbrechen verringern

Änderungshistorie seit der letzten Überarbeitung 03/2024

Wann	Was
06/2024	<ul style="list-style-type: none"> Momelotinib: Kennzeichnung „FDA-Zulassung / keine orale Darreichungsform in D“ entfernt, da in Deutschland jetzt zugelassen

Autor: Jürgen Barth, Apotheker für Klinische Pharmazie & Onkologische Pharmazie,
Universitätsklinikum Gießen-Marburg; Aktualisierung: Oralia-DB Redaktion;

Quelle: Deutsche Fachinformationen (FI) bzw. bei nicht in D Zulassenen die FPI ; Stand: 06/2024;

Trotz sorgfältiger Prüfung wird keine Gewährleistung für Richtigkeit, Aktualität und Vollständigkeit der Angaben und keinerlei Haftung für eventuelle Fehler übernommen.